

抗てんかん薬 副作用チェックシート			重大な副作用とその主な初期症状													よく見られるその他の副作用				
			副作用	皮膚粘膜眼症候群	肝機能障害	過敏症症候群	血液障害	急性腎不全	腎障害	間質性肺炎	SLE症状	急性肺炎	横紋筋融解症	悪性症候群	呼吸抑制	無菌性髄膜炎	その他	運動失調	精神神経系	複視
			初期症状	高熱（38℃以上） 目の充血 まぶたの腫れ 紅斑など	倦怠感 食欲不振 発熱 黄疸 発疹 吐き気	皮膚の広範囲が 赤くなる 高熱 喉の痛み 倦怠感	発熱 喉の痛み 出血傾向 貧血	尿量減少 浮腫 発疹 倦怠感	BUN上昇 クレアチニン上昇 蛋白尿 頻尿 血尿など	発熱 空咳 呼吸困難 息切れ	発熱 紅斑 筋肉痛 関節痛	発熱 激しい腹痛 発熱 嘔吐	筋肉痛 脱力感 K上昇	発熱 意識障害 強度の筋強剛 嚥下困難 頻脈 発汗	呼吸がゆっ くりになっ たり、呼吸 数の減少	40℃ぐらいの発熱 頭部のこわばり 頭痛 嘔気		手足の動き がぎこちない 、審かう まく使えな いなど	眠気 ふらつき めまいなど	
副作用出現 時期	1～3週間	1～6週間 で発症する ことが多い	2～6週間以 内に発症				1～2週間 で発症する ことが多い					1週間以内に 多発	真夜中～早 朝	服用開始後4日目 が多い		長期投与で		最初期 に見られる		
従来品	イミノスチルベン系	カルバマゼピン	テグレトール	○	○	○	○ 再生不良 性貧血	○	○	○	○	○	○	○		○	眠気13.8%	○		
	ベンゾジアゼピン系	クロバザム	マイスタン	○	○	○	○		○							依存症（※1）		眠気38.6%	○	
		クロナゼパム	リボトリール ランドセン		○	○	○									依存症（※1）	○	眠気13.9%	○	
		ジアゼパム	ダイアップ		○	○	○									依存症（※1）		○	○	
	サクシמיד系	エトスクシמיד	エピレオプチマル ザロンチン	○			○ 再生不良 性貧血				○						○	○	0.1%未満 蓋明	
	バルピツール酸系	フェノバルビタール	フェノバル	○	○	○	○		○							依存症（※1）	○	○	○	
		プリミドン	プリミドン	○	○	○	○ 再生不良 性貧血		○							依存症（※1）	○	○	○	
	ヒダントイン系	フェニトイン	アレピアチン ヒダントール	○	○ 劇症肝炎	○	○ 再生不良 性貧血	○		○	○	○	○				○ 小脳萎縮の可 能性もあり	○	○	
		エトトイン	アクセノン	○	○ 劇症肝炎	○	○ 再生不良 性貧血	○		○	○	○	○				○ 小脳萎縮の可 能性もあり	○	○	
	オキサソリジン系	トリメタジオン	ミノアレ	○	○	○	○ 再生不良 性貧血		○		○						○	筋無力症	○	○
	スルホンアミド系	スルチアム	オスポロット				○		○ 腎不全								○	○		
	アセチル尿素系	アセチルフェネ トライド	クランポール		○		○ 再生不良 性貧血		○								○	○		
分枝脂肪酸系	バルプロ酸	デパケン セレニカR	○	○ 劇症肝炎	○	○			○		○				高アンモニア血症を伴う 意識障害（※2）	○ 脳の変縮・認 知症様症状	○	○	0.1～5% 未満 視覚異常	
ベンズイソキサゾール系	ソニサミド	エクセグラン	○	○	○	○ 再生不良 性貧血	○	○	○		○	○			発汗減少に伴う熱中症（※3） 腎、尿路結石（※4）	○	○	○		
新世代薬	GABA誘導体	ガバペンチン	ガバペン	○	○	○	○	○			○					○	傾眠33.5%、 浮動性めまい 15.9%	○		
	ピロリドン系	レベチラセタム	イーケブラ	○	○ 肝不全	○	○				○	○					傾眠32.4%	○		
	トリアジン系	ラモトリギン	ラミクタール	○	○	○	○ 再生不良 性貧血								○	○	○	○		
	フルクトピラノース骨 格 +ファーマート構造	トピラマート	トピナ		○		○		○						発汗減少に伴う熱中症（※3） 腎、尿路結石（※4） 続発性閉塞隅角緑内障（※5） 代謝性アシドーシス（※6）	○	傾眠29.7%、 浮動性めまい 14.5%	○		
希少疾病 用医薬品	Lennox-Gastaut症 候群治療薬	ルフィナミド	イノベロン	○	○ 肝機能・血液障害 を伴う事あり											○	傾眠20.7%	○		
	Dravet症候群 治療薬	スチリベントール	ディアコミット		○		○									○ 58.3%	傾眠79.2%	○		

☆複合アレピアチンとヒダントールFについてはフェニトイン、フェノバルビタールを参照

【その他】（※1）依存症：大量連用により生じる。また、大量投与又は連用中における投与量の急激な減少ないし投与の中止により、けいれん発作、せん妄、振戦、不眠、不安、幻覚、妄想等の離脱症状があらわれることがある

（※2）高アンモニア血症に伴う意識障害：物忘れ、言語障害、意識障害

（※3）発汗減少に伴う熱中症（約1年）：発汗減少、体温上昇、顔面潮紅、意識障害

（※4）腎・尿路結石：腎痛、排尿痛、血尿

（※5）続発性閉塞隅角緑内障（1ヶ月以内）：視力の急激な低下、眼痛、頭痛、嘔吐

（※6）代謝性アシドーシス：食欲不振、疲労、過換気、不整脈、昏睡