

抗不整脈薬副作用
チェックシート

			副作用とその主な初期症状																	
			副作用	心不全	QT延長	SLE 様症状	無顆粒球症	消化器症状	精神神経系 症状	電解質異常	抗コリン作用	低血糖	肝機能障害	間質性肺炎	急性腎不全	中枢性の 副作用	気管支収 縮	甲状腺機 能障害	Stevens- Johnson症候 群	
			初期 症状	動悸 息切れ 手足や顔 のむくみ	気の遠く なるよう なめまし い、胸苦 しさ	関節痛 筋肉痛 発熱	発熱 のどの痛み 倦怠感	吐き気 食欲不振 下痢	頭痛 不眠 幻視 幻覚 浮動性めま い	下痢や嘔 吐（特に 血中K低 下）	眼圧上昇（緑 内障悪化） 目のちらつき まぶしさ 口渇 排尿障害 便秘	冷や汗 ひるえ 倦怠感 異常な空 腹感 動悸 頭痛	倦怠感 発熱 黄疸 発疹 吐き気	発熱 咳 息苦しさ	浮腫 高血圧 倦怠感 悪心・嘔吐 食欲不振	めまい 頭痛	喘息症状 誘発・悪 化、息苦 しさ	動悸 食欲不振 倦怠感	高熱 眼の充血 めやに 瞼の腫れ のどの痛みなど	
			副作用出 現時期	薬や体質 などによ る、期間 様々			薬開始から 2～3か月 が多い					薬の種類 によりけ り、早い ものは数 分	バラつきが大 きい、早く出 る場合は数 日、半年以上 かかって出る こともある	アレルギー-反応なら 1～2週間程 度、細胞障害性 の場合は数か月 ～数年経ってか らの場合もある				維持量に なっただ から時間 をおいて 重篤な亢 進症、ま たは緩徐 な低下症	数日～1か月以 内、特に2週間 以内が多い	
Ia	プロカインアミド	アミサリン	○	○	○	○	○	○	○	○										
	シソピラミド	リスモダン	○	○		○			○	○強	○	○								
	シベンソリン	シベノール	○	○		○			○	○中	○	○		○						
	ビルメノール	ビメノール	○	○					○	○弱	○									
Ib	メキシレチン	メキシチール					○		○			○	○	○						○
	アブリンジン	アスペノン				○	○		○				○	○						
Ic	ビルジカイニド	サンリズム					○		○				○		○	○				
	フレカイニド	タンボコール					○		○				○			○				
	プロパフェノン	プロノン					○		○											
β遮断	プロプラノロール	インデラル	○			○												○		
	メトプロロール	セロケン	○					○					○					○		
	アテノロール	テノミン	○						○									○		
	ナドロール	ナディック	○						○									○		
	ビスプロロール	メインテート					01%未満	○					○					○		
	アセプトロール	アセタノール	○						○											
	カルテオロール	ミケラン	○						○									○		
	アロチノロール	アロチノロール	○						○											
K遮断	アミオダロン	アンカロン	○	○									○	○					○	
	ソタロール	ソタコール	○	○						○										
Ca拮抗	ベラパミル	ワソラン	○				○													○
	ベプリシル	ベプリコール	○	○		○	○		○											○（投与開始 4ヶ月以内に多 い）