

定型抗精神病薬	副作用	錐体外路症状	高プロラクチン血症	起立性低血圧	抗コリン作用	過鎮静	高血糖	低血糖	不整脈	消化器症状	体重増加	精神神経症状	悪性症候群	肝機能障害	麻痺性イレウス	SLE様症状	血液障害 (無顆粒球症など)	横紋筋融解症	抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(SIADH)	過敏症症候群	中毒性表皮壊死融解症、皮膚粘膜炎症候群(※)紅皮症	肺塞栓症、深部静脈血栓症	眼障害	痙攣
		動作が鈍い、表情が少ない、声が小さい、振戦、落着きがない	月経異常 乳汁分泌 射精不能	立ちくらみ	口渇、便秘、尿閉	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下	口渇多飲多尿 体重減少	冷や汗、ふるえる、倦怠感、異常な空腹感、動悸、頭痛	食欲不振、食不振、舌苔、悪心・嘔吐、下痢、便秘	食欲亢進、体重増加	不眠めまい頭痛不安興奮	高熱、発汗、意識のくもり、手足の震え、こわばり、話しづらい、頻脈、血圧上昇など	倦怠感、発熱、黄疸、発疹、吐き気	お腹がはる著しい便秘	関節痛 筋肉痛 発熱	発熱のどの痛み 倦怠感 手足に点状出血 あおあざができる 出血しやすい	手足・肩・腰・その他の筋肉が痛む、手足がしびれる、手足に力が入らない、赤褐色尿	浮腫のない急な体重増加、全身倦怠感、頭痛、吐き気、眩暈、傾眠	皮膚の広い範囲が赤くなる、高熱(38℃以上)、のどの痛み、倦怠感、食欲不振、リンパ節の腫れ	発熱 眼充血 口内炎 咽頭痛 (※) 紅斑 水疱・びらん そう痒感	大腿から下の脚に発赤、腫脹、痛み等の症状が出現	調節障害、角膜・水晶体の混濁、網膜・角膜の色素沈着 など	顔の筋肉がピクピクと動く、全身が硬直する、足などの筋肉がつる	
		副作用出現時期	90%の症例が20日以内で発症											1週間以内に多発	早く出る場合は数日、半年以上かかって出ることもある			薬開始から2~3か月が多い		通常、薬剤使用開始後数日~数週間	2~6週間以内が多い	2週間以内が多い		
フェノチアジン系																								
クロロプロマジン	コントミン ウィンタミン	○	0.1~5%未満	○	○	○	○		心室頻拍(重大なSE)	○	0.1~5%未満	○	○	○	0.1%未満	○	○	○	○	○	○	○	○	○
クロロプロマジン・フロメタジン・フェノバルビタール配合	ベグタミンA・B	○	○	○	○	○	○		心室頻拍(重大なSE)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
レボプロマジン	ヒルナミン レボトミン	○	0.1~5%未満	○	○	○	○		○	○	0.1~5%未満	○	○	○	0.1%未満	0.1%未満	○	○	○	○	○	○	○	○
ペルフェナジン	ビーゼットシート トリラホン	○	0.1~5%未満	○	○	○	○		○	○	0.1~5%未満	○	○	○	0.1%未満	0.1%未満	○	○	○	△(類薬)		○	○	○
フルフェナジン	フルメジン フルデカシン	○	0.1~5%未満	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	0.1%未満	0.1%未満	○	○	△(類薬)			○	○	○
プロクロルペラジン	ノパミン	○	0.1~5%未満	○	○	○	○		○	○	0.1~5%未満	○	○	○	0.1%未満	0.1%未満	○	○	○			○	○	○
プロペリシアジン	ニューレブチル	○	0.1~5%未満	○	○	○	○		○	○	0.1~5%未満	○	○	○	0.1%未満	0.1%未満	○	○	○			○	○	○
ブチロフェノン系																								
ハロペリドール	セレネース	○	○	5%未満	○	○			○	○	5%未満	○	○	○	5%未満	○	○	○	○			○	○	○
ハロペリドールデカン酸エステル	ハロマンズ ネオペリドール	○	○	○	○	○			心室細動 心室頻拍	○	0.1~5%未満	○	0.1%未満	0.1~5%未満	0.1%未満		○	○	○			○	○	○
プロムペリドール	インプロメン	○	○	○	○	○			○	○	0.1~5%未満	○	○	○	○		○	○	○			○	○	○
ピバンペロン	プロピタン	○	○	○	○	○			○	○	0.1~5%未満	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○
スピペロン	スピロピタン	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	0.1~5%未満	○	○	○	○	○			○	○	○
チミペロン	トロペロン	○	○	○	○	○			○	○	0.1~5%未満	○	○	0.1~5%未満	○	○	○	○	○			○	○	○
ベンザミド系																								
スルピリド	ドグマチール/アピリット/ミラドール	○	○	○	○	○			QT延長 心室頻拍	○	○(高用量)	○	0.1%未満	0.1%未満(高用量)			0.1%未満					0.1%未満	○(高用量)	0.1%未満
スルトフリド	バルネチール	○	○	○	○	○			QT延長 心室頻拍	○	0.1~5%未満	○	0.1~5%未満	0.1~5%未満	0.1~5%未満		○					○	○	0.1~5%未満
チアフリド	グラマリール	○	0.1~5%未満		○	○			QT延長 心室頻拍	○		○	0.1%未満	○									0.1~5%未満	0.1~5%未満
ネモナフリド	エミレース	○	0.1~5%未満	○	○	○			○	○	○	○	0.1%未満	頻度不明			○					○	○(霧視)	

非定型抗精神病薬	副作用と主な初期症状	副作用	錐体外路症状	高プロラクチン血症	起立性低血圧	抗コリン作用	過鎮静	高血糖	低血糖	不整脈	消化器症状	体重増加	精神神経症状	悪性症候群	肝機能障害	麻痺性イレウス	無顆粒球症、白血球減少	横紋筋融解症	抗利尿ホルモン不適合分泌症候群 (SIADH)	肺塞栓症、深部静脈血栓症	眼障害	てんかん発作	脳血管障害	心筋炎、心筋症、心嚢液貯留	痙攣	
		症状	動作が鈍い、表情が小さい、声が小さい、振戦、不随意運動、落ち着きがない	月経異常 乳汁分泌 射精不能	立ちくらみ	口渇 便秘 尿閉	眠気、 注意力・ 集中力・ 反射運動 能力等の 低下	口渇、 多尿、 減少	多飲 多体重	冷や汗 ふるえ 倦怠感 異常な 空腹感 動悸 頭痛	動悸 めまい 胸部違和 感 息切れ 胸痛	食欲亢 進、食欲 不振、舌 苔悪心・ 嘔吐、下 痢、便秘	食欲亢進 体重増加	不眠 めまい 頭痛 不安 興奮	高熱、発 汗、意識 のくもり、 手足の震 え、こわ ばり、話 しづら い、頻脈、 血圧上昇	倦怠感 発熱 黄疸 発疹 吐き気	お腹がは る 著しい便 秘 腹痛 吐き気・嘔 吐	発熱 のどの痛 み 倦怠感 手足に点 状出血 あおあざ ができる 出血しや すい	手足・肩・ 腰・その他 の筋肉が痛 む 手足がしび れる 手足に力 が入らない 赤褐色尿	浮腫のない 急な体重増 加、全身倦 怠感、頭痛 吐き気 眩暈 傾眠	大腿から 下の脚に 発赤、腫 脹、痛み 等の症状 が出現	調節障害、 角膜・水 晶体の混濁、 網膜・角 膜色素沈 着など	痙攣、意 識の消失 まぼろし する	頭痛 めまい 吐き気	安静時の 持続性 頻脈 動悸 不整脈 胸痛や 心不全 の症状	顔の筋肉 がヒクヒ クと動く、 全身が硬 直する、 足などの 筋肉がつ る
		副作用出現時期	90%の症例が20日以内で発症													早く出る場合は数日、半年以上かかって出ることもある		薬開始から2～3か月が多い		通常、薬剤使用開始後数日～数週間						
SDA																										
リスペリドン	リスパダール	○	1%未満	1%未満	○	○	○	0.04%	○	0.4%	○		○	0.15%	0.97%	0.06%	○	0.02%	○	○	○			0.04%		
バリペリドン	インヴェガ	○	1～5%	○	○	○	○	1.3%	0.3%	0.6%	○	5%以上	○	○	4.2%	○	○	○	○	○	○			○		
バリペリドン バルミチン酸 エステル	ゼプリオン	○	5%以上	1%未満	○	○	○	0.4%	○	0.2%	○	1～5%	○	○	1.8%	○	○	○	○	○	○			○		
ペロスピロン	ルーラン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0.1～1%未満	○	0.1～1%未満	○	0.1～1%未満	○	○	0.1～1%未満	○	○					○
プロナセリン	ロナセチン	○	5%未満	○	○	○	○	△ (類薬)	○	○	○	5%未満	○	5%未満	○	○	○	○	○	○	○					
MARTA																										
オランザピン	ジブレキサ	○	○	0.1～1%未満	○	○	○	○ (警告あり)	○	○	○	10%以上	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○
クエチアピン	セロクエル	○	○	1～5%未満	○	○	○	1～5%未満 (警告あり)	○	○	○	1～5%未満	○	1%未満	1～5%未満	1%未満	○	○	○	○	○				○	1%未満
クロザピン	クロザリル	○	○	5%以上	○	○	○	5%以上 (警告あり)	○	○	○	5%以上	○	5%未満	○	腸閉塞もあり	5%未満 (警告あり)	○	○	○	○		5%未満			○
DPA																										
アリピプラソール	エビリファイ	○	○	1%未満	○	○	○	○ (警告あり)	○	○	○	5%以上	○	0.1%	0.1%	○	○	0.1%	○	○	○					0.4%
ソテピン	ロドピン	○	○	○	○	○	○	○	0.1%未満	○	○	0.1%未満	○	0.1%未満	0.1～5%未満	0.1%未満	0.1%未満	○	△ (類薬)	○	○					0.1～5%未満
その他																										
クロカプラミン	クロフェクトン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0.1～5%未満	○	○	○	○	○	○			△ (類薬)		
モサプラミン	クレミン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0.1%未満	0.1～5%未満	△ (類薬)	○	○	△ (類薬)	○	○					○
オキシペルチン	ホーリット	○	0.1～5%未満	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					

抗うつ薬	副作用	過鎮静	性功能障害	起立性低血圧	抗コリン作用	消化器症状	体重増加	精神神経症状	錐体外路症状	悪性症候群	セロトニン症候群	てんかん発作	横紋筋融解症	無顆粒球症	麻痺性イレウス	間質性肺炎、好酸球性肺炎	抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(SIADH)	心不全	QT延長 心室頻拍	肝機能障害	中毒性表皮壊死融解症、皮膚粘膜眼症候群	高血圧 クリーゼ	顔、舌部の浮腫	痙攣、せん妄、錯乱、幻覚、妄想	
		症状	性欲減退・亢進 月経異常 乳汁分泌 女性化乳房 射精不能、勃起障害	立ちくらみ	口渇 便秘 尿閉	食欲亢進、 食欲不振、 舌苔、嘔吐、 下痢、便秘	食欲亢進、 体重増加	不安 焦燥 不眠 敵意 衝動性 易刺激性	動作が鈍い、 表情が少ない 声が小さい 振戦 落ち着きがない	高熱、発汗 意識のくもり 手足の震え こわばり 話づらい 頻脈 血圧上昇	不安 混乱 いらいら 興奮 手足が勝手に動く 脈が早くなる	痙攣 意識の消失 またはぼんやりする	手足・肩・ 腰・その他 の筋肉が痛む、 手足がしびれる、 手足に力が入らない、 赤褐色尿	発熱 のどの痛み 倦怠感	お腹がはる 著しい便秘 腹痛 吐き気 嘔吐	発熱 咳嗽 呼吸困難 肺音の異常	浮腫のない急 な体重増加 全身倦怠感 頭痛 吐き気 眩暈 傾眠	動悸 息切れ 手足や顔のむくみ	気の遠くなるよう なめまい 胸苦しさ	倦怠感 発熱 黄疸 発疹 吐き気	高熱(38℃以上) 目の充血 まぶたの腫れ 紅斑など	意識障害 頭痛 悪心、嘔吐 局所神経症状	顔、舌部のむくみ	顔の筋肉がピクピクと動く、 全身が硬直する、 足などの筋肉がつる	
		副作用出現時期								90%の症例が20日以内で発症	1週間以内に多発	多剤併用で出現することが多い、 増量や薬の追加の際は注意			薬開始から2~3か月が多い			通常、薬剤使用開始後数日~数週間			バラつきが大きい、早く出る場合は数日、半年以上かかって出ることもある	2週間以内が多い			
三環系抗うつ薬																									
クロミプラミン	アナフラニール	○	○	5%以上	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
ノルトリプチン	ノリトレン	○	○	○	○	○	○	○	○	△(類薬)		○		○	○		△(類薬)		△(類薬)	○					
アミトリプチン	トリプタノール	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				5%以上				0.1%未満	○
アモキサピン	アモキササン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				△(類薬)	○	○			○
イミプラミン	トフラニール	○	乳房肥大 乳汁漏出	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
トリミプラミン	スルモンチール	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
ロフェプラミン	アンプリット	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
ドスレピン	プロチアデン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
四環系抗うつ薬																									
ミアンセリン	テトラミド	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○
マプロチリン	ルジオミール	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○
セチプチリン	テシプール	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○
SSRI																									
パロキセチン	パキシル	○	○	○	○	○	○	○	○	0.03%	0.04%	○	○	0.46%							0.01%				0.1%未満
セルトラリン	ジェイソロフト	○	○	1%未満	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○
フルボキサミン	デプロメールボックス	○	○	0.1%未満	○	○	○	○	○	0.1%未満	0.2%未満	○	○	白血球 血小板減少							○				0.1%未満
エスチロプロラム	レクサプロ	○	○	1%未満	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○
SNRI																									
デュロキセチン	サインバルタ	○	○	1~5%未満	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				0.1%未満
ミルナシプラン	トレドミン	○	○	0.1~5%未満	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				0.1%未満
NaSSA																									
ミルタザピン	リフレックスレメロン	○	不正子宮 出血	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○
その他																									
トラゾドン	レスリンデジレル	○	持続性勃起 (重大)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○

		重大な副作用															
気分安定薬 他	副作用	リチウム中毒	悪性症候群	洞不全症候群 高度徐脈	腎性尿崩症	急性腎不全、 間質性腎炎、 ネフローゼ症候群	甲状腺機能低下症 甲状腺炎	副甲状腺機能亢進症	認知症様症状 意識障害	狭心症	薬剤性過敏症症候群	中毒性表皮壊死融解症 皮膚粘膜眼症候群	肝機能障害	脳血管障害 (血管炎、 脳梗塞、脳出血、脳卒中)	精神神経症状	よく見られる副作用	
	症状	食欲低下 嘔気、嘔吐 下痢 振戦 傾眠 錯乱 運動障害 発熱、発汗	高熱、発汗 意識のくもり 手足の震え こわばり 話しぶらい 頻脈 血圧上昇	動悸がする、脈が飛ぶ	尿量の著しい増加、 激しい口渇がみられ、 その症状が持続する場合	尿量減少 浮腫 体重増加 悪心 嘔吐 下痢	甲状腺腫（前頸部の腫れ） やる気がおこらないが 疲れやすい まぶたが腫れぼったい、 寒がり、体重増加、 動作がおそい いつも眠たい 物覚えが悪い 便秘、かすれ声	イライラ感 だるさ 食欲低下 吐き気や腹痛	手足が震える 歩行困難になる 自発性が低下する 物忘れがみられる	胸が圧迫されるような 痛み苦しさ 息切れ	発疹 発熱	高熱（38℃以上） 目の充血 まぶたの腫れ 紅斑	倦怠感 発熱 黄疸 発疹 吐き気	激しい頭痛 しびれ めまい 言語障害 麻痺 発疹（血管炎）	不安 焦燥 不眠 敵意 衝動性 易刺激性		
	副作用出現時期		1週間以内に多発									2～6週間以内が多い	2週間以内が多い	バラつきが大きい、早く出る場合は数日、半年以上かかって出ることもある			
気分安定薬																	
炭酸リチウム	リーマス	○	○	○	○	○	○	○	○						○	振戦（4.5%）、口渇（2.4%） 下痢（1.2%）	
カルバマゼピン	テグレトール	抗てんかん薬のシート参照														眠気（13.8%）めまい（9.1%） ふらつき（8.5%）けん怠・易疲労感（3.5%）、運動失調（3.5%）	
バルプロ酸Na	デパケン パレリン ハイセレニン															傾眠（5.5%）失調・ふらつき（3.6%）嘔気・悪心・嘔吐（2.6%） 食欲不振（1.7%）	
ラモトリギン	ラミクタール															傾眠（18.5%）めまい（15.2%） 肝機能障害（7.8%）発疹（6.3%） 複視（5.4%）	
精神刺激薬																	
メチルフェニデート	リタリン コンサータ		○							○			○	○	不眠	口渇（32.9%）頭痛（14.8%） 発汗（24.3%）食欲減退（16.9%） 不眠、チック	
パモリン	ベタナミン												○		依存性あり（重大なSE）	口渇（15.6%）不眠（9.6%） 胃腸障害（4.2%）発汗（4.2%） 心悸亢進（3.6%）	
モダフィニル	モディオダール										○	○				頭痛（21.5%）口渇（11.7%） 不眠（9.1%）動悸（5.8%）	
メタンフェタミン	ヒロポン														依存性あり（重大なSE）	副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない	
選択的ノルアドレナリン再取り込み阻害薬																	
アトモキセチン	ストラテラ												○		○	頭痛（22.3%）食欲減退（18.3%） 傾眠（14.0%）腹痛（12.2%） 悪心（9.7%）	